

Beiträge
zur
subcutanen Oberkiefer-Resection.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde

in der
Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe
unter dem Präsidium

des Herrn Geheimrath
PROF. DR. J. N. RITTER VON NUSSBAUM
Königl. Bayer Generalstabsarzt à l. s. etc. etc.

einer hohen
medizinischen Facultät
der

kgl. Ludwig-Maximilians-Universität in München

vorgelegt von
Friedrich Wilhelm Wagenhäuser
approb. Arzt.

München, 1885.

Kgl. Hof- & Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Beiträge
zur
subcutanen Oberkiefer-Resection.

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung der Doctorwürde

in der
Medizin, Chirurgie und Geburtshilfe

unter dem Präsidium

des Herrn Geheimrath

PROF. DR. J. N. RITTER VON NUSSBAUM

Königl. Bayer Generalstabsarzt à l. s. etc. etc.

einer hohen

medizinischen Facultät

der

kgl. Ludwig-Maximilians-Universität in München

vorgelegt von

Friedrich Wilhelm Wagenhäuser

approb. Arzt.

München, 1885.

Kgl. Hof- & Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.

Subcutane Oberkiefer-Refektion nennt Langenbeck jene Operation, durch welche die Einheilung des aus seinen knöchernen Verbindungen gelösten und wieder eingefügten Oberkiefers ermöglicht ist.

Am 3. November 1859 machte v. Langenbeck schon den ersten Versuch, indem er den zur Ausrottung eines Nasen-Rachen-Polypen mit dem Nasenbein refectierten proc. nas. des Oberkiefers wieder einfügte und die Hautwunde darüber vereinigte. Dieser erste Versuch war von vollständigem Erfolge gekrönt, indem die herausgelösten Knochen prima intentione einheilten und nirgends eine Knochen-Exfoliation zu Stande gekommen ist.

Erst in neuester Zeit bot sich Langenbeck die Gelegenheit, die Refection einer Oberkieferhälfte nach dieser Methode auszuführen und so die mit dieser Operation stets verbundene Verstümmelung vollständig zu vermeiden. In der That kann der Sitz der Nasenrachen-Polypen nämlich nach Langenbeck ein solcher sein, daß die Refection einer Oberkieferhälfte erforderlich wird, wie diese mehrfach von Robert und Maifoneuve zu diesem Zwecke ausgeführt wurde. In den bis jetzt d. h. bis zum Jahre 1861 vorgekommenen Fällen reichte die Extraction von der Mund- und Nasenhöhle oder die Spaltung des velum palatinum nebst Refection des pars horizontalis oss. palat. nach Nélaton oder endlich die ausführliche Refection des proc. nasalis des Oberkiefers aus zur

Beseitigung der Fremdbildungen und konnte sich v. Langenbeck bis dahin zur Refection des Oberkiefers nicht entschließen, gibt aber zu, daß bei recht großen Geschwülsten, welche in der Umgebung der tuba und des for. sphenopalat. sowie eines sinus sphenoidalis angehäuft sind, die Entfernung des Oberkiefers der alleinige sichere Weg zu ihrer vollständigen Ausrottung sei.

Es gibt aber auch Geschwülste, welche in der fossa pterygopalatina wurzelnd, nach der Nasenrachenhöhle und andererseits nach der fossa sphenomaxillaris hinein und folglich den Oberkiefer dergestalt umwachsen, daß die Nothwendigkeit der vorherigen Entfernung des Oberkiefers unausbleiblich ist. — Langenbeck glaubte, daß die bewusste Gegend zugänglich werde in ihrer größten Ausdehnung, sobald man den ganzen oberen Theil des Oberkiefers entferne, und daß es möglich sein werde, den harten Gaumen, das Gaumensegel und den Alveolar-Fortsatz zu erhalten, er hoffte, daß es gelingen werde, den entfernten Oberkiefer wieder einzufügen und wieder mit den angrenzenden Knochen zusammenzuheilen, wie dies ihm mit dem proc. nasalis gelungen war. Freilich dürfte der wieder einzuheilende Oberkiefer an einer Stelle feiner weichen Bedeckung (Weichtheile des Gesichtes, Schleimhaut und Periost) nicht beraubt werden. Erstes hoffte Langenbeck zu erreichen, wenn er die Ablösung der Weichtheile des Gesichtes vom Knochen unterlasse und diese einfach bis auf den Knochen durchschnitt in der Richtung, welche die Säge zu durchlaufen hatte, in Bezug auf das letztere Desiderat schien ihm die Nahtverbindung des proc. nas. des Oberkiefers mit dem Nasenbein und mit dem Nasenfortsatz des Stirnbeins die geeignetste Stelle zu sein. Langenbeck hoffte nemlich, daß der Oberkiefer sich in dieser Nahtverbindung wie in einem Charnier beweglich machen lasse. Oberhalb dieser Stelle und folglich in der ganzen Länge der Nase beschloß Langenbeck auch die Gesichtshaut nicht zu

durchschneiden und so eine reichliche, 2 Zoll breite Ernährungsbrücke für den mit dem Oberkiefer herauszulösenden Lappen der Weichtheile stehen zu lassen.

Es sei mir nun gestattet den ersten Fall zu beschreiben, wo Langenbeck die subcutane Oberkiefer Resection am Platze fand.

Ein 15 Jahre alter Knabe bemerkte zuerst im Frühjahr 1859 Luftmangel in der linken Nasenhöhle, welcher immer zunahm. Vor etwa 7 Wochen bemerkte er eine Auftreibung der linken Wange und Hervortreten des Augapfels. Im Bereiche des harten Gaumens zeigte sich links eine Anschwellung, welche angefochten Blut entleert haben soll. Linke Gesichtshälfte tritt hervor, der linke Augapfel ragt mehr aus der orbita hervor, erscheint daher grösser, linke Wange scheint hervorgetrieben, linke Nasenhöhle vollkommen verstopft, Sprache war näselnd. Hinter dem Gaumensegel in die Höhe steigend fühlt der untersuchende Finger die linkseitige Choane mit einer festen, resistent elastischen lappigen Geschwulstmasse ausgefüllt und den Eingang in die linke Nasenhöhle verlegt. Langenbeck diagnostizierte ein Fibroid der fossa pterygopalatina, welche von hier aus durch das for. sphenopal. in die Rachen- und Nasenhöhle, andererseits in die fossa sphenomaxillaris und um den Oberkiefer herum zur äusseren Wand desselben und zum musc. masseter gegen die innere Wangenfläche vorgewachsen sei.

Hier hielt Langenbeck zum ersten Male die Resection für unbedingt nothwendig, weil die Geschwulst auch gleichzeitig in die Nasenhöhle eingedrungen war, nicht nur in die fossa sphenomaxillaris und temporalis. Am 1. Juli 1861 erfolgte nun die Operation.

Operationsmethode:

1) Schnitt von der Einfügestelle des linken Nasenflügels in die Wange durch diese mit nach unten sehender Convexität

gegen den unteren Rand des Jochbeines und an diesem entlang bis auf die Mitte des proc. zypomat. oss. temporum.

2) Schnitt, später geführt, oberer Hautschnitt ging von dem proc. nas. oss. front. linkerseits an dem unteren Rande der orbita entlang und über den proc. front. des Oberkiefers bis auf die Mitte des proc. zygomat. oss. temporum, wo er mit dem unteren Schnitte in einem stumpfen Winkel zusammentrifft. Ohne die Haut von den darunter liegenden Weichtheilen abzulösen drang Langenbeck nun durch den unteren Schnitt gegen den Oberkiefer vor, durchschnitt das Periost desselben und löste den musc. masseter vom unteren Rande des Jochbeines ab. Nachdem nun die starke hervorgewölbte fascia buccalis durchschnitten worden war, trat eine lappige, weiß glänzende Geschwulst zu Tage, welche sich zwischen die stark eingedrückte Außenfläche des Oberkiefers und dem Kronenfortsatz des Unterkiefers gegen die fossa sphenomaxillaris nach hinten erstreckte. Nachdem der Unterkiefer vom Oberkiefer mittelst eines speculums entfernt worden war, konnte Langenbeck nun ohne Schwierigkeit die Geschwulst vom Oberkiefer abheben und mit dem linken Zeigefinger zwischen Oberkiefer und Geschwulst vordringend bis in die fossa pterygopalatina gelangen. Da das Oberkiefer durch die Geschwulst eingedrückt und die fossa sphenomaxillaris und pterygopalatina erheblich erweitert war, so gelang dies ohne Schwierigkeit und die Spitze des Zeigefingers drang in die letzt genannte Grube bis gegen die Nasenhöhle (durch das erweiterte for. sphenopalatinum) vor. Ein leichter Druck war nun hinreichend um ein Elevatorium auf diesem Wege bis in die Rachenhöhle einzuführen. Nun durchfagte Herr von Langenbeck zuerst mit der Kettenfäße den Jochbogen, dann führte er zweitens eine feine, gerade Stichfäße von außen durch die fossa pterygopalatina und for. sphenopal. in die Rachenhöhle und durchfagte den ganzen Oberkiefer, von hinten nach vorn mit einem horizontalen Sägeschnitt, während der vom Mund aus in die Rachenhöhle einge-

führte linke Zeigefinger die Sägspitze auffing und ihr Anstoßen gegen das septum narium verhinderte. Es wurde nun der oben geschilderte 2. Hautschnitt ebenfalls bis auf den Knochen geführt, in die orbita eingedrungen und die Weichtheile in dem Winkel zwischen proc. front. und temporal. des Jochbeins durchschnitten.

Der 3. Sägeabschnitt verlief nun von unten nach oben durch den proc. zygomat. des Schläfebeins, proc. front. des Jochbeins; in die fiss. orb. int. und von hier durch den proc. orbit. des Oberkiefers bis zum Thränenbein. Der resecirte Oberkiefer hing fomit nur noch mit dem linken Nasenbein und dem proc. nas. des Stirnbeins vermittelt seines unverletzt gebliebenen Nasenfortsatzes zusammen und im Bereich dieser zur Ernährungsbrücke ausersehenen Knochenverbindung war auch die äußere Haut unverletzt erhalten. Der harte Gaumen und der Alveolarfortsatz dieser Kieferhälfte ist unverletzt geblieben. Mit einem unter dem Jochbein eingeführten Elevatorium hob Langenbeck nun den Oberkiefer in die Höhe. Dies gelang ohne Schwierigkeit und ohne weitere Verletzung der Knochen, indem der Oberkiefer sich in der Nahtverbindung mit dem linken Nasenbein und dem Nasenfortsatz des Stirnbeins wie in einem Charniergelenke bewegte und gleich dem geöffneten Deckel einer Dose dergestalt in die Höhe stand, daß das Jochbein sich fast in der Mittellinie des Gesichtes befand und die fossa sphenomaxillaris u. pterygopalatina sowie Nasenrachenhöhle vollkommen zugänglich geworden war. Es ergab sich nun folgendes:

Die Geschwulst befand sich ganz so, wie Langenbeck sie diagnostizirte mit ihrem dünnsten, etwa fingerdicken Stiel in der fossa pterygopalatina und ging, einem Quersack nicht unähnlich, nach 2 Seiten hin in eine etwa hühnereigrosse, lap-pige Geschwulstmasse aus, von denen die eine die Nasenrachenhöhle, die andere die fossa sphenomaxillaris erfüllte und vom Jochbogen leicht eingeschnürt, sich ein wenig in die fos. tempor.

hinein und gegen die foss orb. inf. hinein vorgedrängt hat. Der stielartige Theil der Geschwulst wurde nun ohne Schwierigkeit mit einem breiten, meißelartigen Elevatorium aus der fossa pterygopal. herausgelöst, sodann der in der Rachenhöhle steckende Theil mit einer starken Polypenzange gefaßt und ebenfalls herausgezogen. Perforation der Schädelbasis war nirgends zu entdecken, die Blutung war während der Operation bedeutend, wegen der großen Ausdehnung der Arterien, stand jedoch gegen das Ende der Operation von selbst.

Nachdem die ganze große Wundhöhle sorgfältigst gereinigt und man sich nochmals überzeugt hatte, dass die Geschwulst vollkommen entfernt war, wurde das herausgelöste Oberkiefer in seine Lage zurückgedrängt und die Durchsäguugsstelle in die genaueste Berührung gebracht. Durch die stehengebliebene Verbindung mit dem linken Nasenbein und dem Nasenfortsatz des Stirnbeins zeigte der Oberkiefer eine Neigung, wieder in die Höhe zu federn und mußte durch leichten Druck in seiner Lage erhalten werden, bis die Hautwunde durch die Eisendrähte vollständig vereinigt war. Ueber die vereinigte Wunde kam ein Ceratlappen und ein dickes Lager Charpie, darüber eine gewöhnliche Binde.

Am 18. Juli war die Wundheilung überall schon vollendet, die Eiterung in der Tiefe versiegte, das Kauen von festen Speisen immer noch nicht gestattet, weil die Consolidation der durchsägten Knochentheile sich noch nicht hergestellt hatte. Eine Beweglichkeit des wieder eingefügten Oberkiefers ist übrigens selbst bei starkem Druck nicht mehr möglich.

Nachdem Langenbeck am 12. Juli einen 2. Fall gerade so operirte und es ihm wiederum gelang, mit derselben Leichtigkeit den Oberkiefer zu trennen und wieder einzufügen, so machte er folgende Schlussfolgerungen:

1) die Resection des Oberkiefers mit der Hinterlassung des palat. dur. und des proc. alveol. ist ausreichend, um die in der

Nasenhöhle und der benachbarten Gegend wurzelnden Geschwülste vollkommen zugänglich zu machen.

2) Die Exstirpation der ganzen Oberkieferhälfte ist also für diesen Zweck nicht mehr gestattet.

3) Es ist möglich vom for. sphenopalat aus den ganzen Oberkiefer in horizontaler Richtung zu durchschneiden.

4) Das mit den umgebenden Weichtheilen exstirpirte Oberkiefer kann ohne Defekt wieder eingeheilt werden.

Diese Schlussfolgerungen von Langenbeck waren so wichtig, daß die meisten der Chirurgen und zwar die bedeutendsten von nun an die Entfernung der Fibrome im Nasenrachenraum, die von irgend einem knöchernen Theile der Rachenwandungen ausgehen und in die Nasenhöhle hineinwuchern, nach v. Langenbecks Methode vornahmen.

Ehe ich jedoch die Vortheile dieser Methode schildere, halte ich es für nothwendig den Ort zu bezeichnen, von wo aus diese heimtückischen Geschwülste ausgehen. Gewöhnlich nehmen sie ihren Ausgangspunkt von der Schädelbasis, besonders vom Periost der unteren Fläche des Körpers vom Keilbein, auch von der Höhle des Keilbeins, oder von der Aponeurose des for. lacer. Manchmal jedoch entspringen sie seitlich vom proc. pterygoideus, auch von der vorderen Fläche der Halswirbelsäule als Retropharyngealtumoren, am seltensten jedoch von dem knöchernen Boden der Nasenhöhle.

Die überwiegende Majorität der Nasenrachenpolypen gehen von der Schädelbasis aus.

Nélaton constatirte, daß diese Krankheit eine Pubertätskrankheit sei, trete sie erst im vorgeschrittenen Alter auf, so ist der Ursprung doch aus der Jugendzeit zu nehmen. Es ist eine das Leben bedrohende Krankheit. Wächst der Tumor weiter nach abwärts, so wird das Schlingen behindert, er verlegt den aditus ad laryngem, und Erstickungstod ist die unbedingte Folge. Aber nicht allein dadurch wird er gefährlich, sondern auch Blutungen aus der Nase können sich einstellen,

deren Stillung ganz unmöglich ist und die eine sofortige Operation erheischen. Jahre lang wächst der Tumor bis er der dringenden Hilfe bedarf. Eine Hauptgefahr, die so ein Nasenrachenpolyp bringen kann, ist auch die, daß eine Perforation des Schädels entsteht, meningitis eintritt und wiederum der Tod unausbleiblich ist.

Da also so ein Tumor immer das Leben im höchsten Grade bedroht, so ist wohl aus 3 Gründen eine frühzeitige Operation am Platze:

1. Weil die Operation, ist sie schon dringend, eine meningitis veranlassen kann.
2. Geht der Tumor stellenweise in sarcomatoese Umwandlung über, so sind Recidiven sicher.
3. Frühzeitig operiren können wir da die Diagnose bei richtiger Untersuchung ziemlich früh gestellt werden kann, abgesehen davon, daß diese mit solchen Tumoren behafteten Leute ein sehr charakteristisches Aussehen bieten, wie es wohl nicht leicht bei einer anderen Krankheit der Fall ist. Ihr schläfriges Benehmen, ihr matter Blick, der stets offene Mund, die schnarchende Athmung, die Verbreiterung der einen Nasenhöhle zwingt uns die Diagnose gleichsam auf.

Fügen wir dann dieser oberflächlichen uns fast ein sicheres Krankheitsbild bietenden Inspektion noch eine kleine Untersuchung an, indem wir den Rachenraum abtasten mit den Fingern und mit dem untersuchenden Finger von rückwärts in die Nasenhöhle eindringen, um uns zu orientiren, ob der Tumor rechts oder links herabsteigt, ob man zu beiden Seiten des Tumors mit einem Finger hinaufkann, ob er Fortsätze in eine oder beide Choanen hineinsendet, wie seine Oberfläche ist, seine Resistenz und Beweglichkeit, drücken wir endlich noch den Zungengrund nieder, so sehen wir sicher einen lappigen, gelblich rothen, vielleicht sogar mit einzelnen Gefäßverzweigungen an seiner Oberfläche versehenen, bei der Respiration

unbeweglichen, beim Berühren mit der Sonde eine ziemlich grofse Resistenz bietenden Tumor.

Sprechen wir dann noch mit dem Kranken, so ist es gerade so, als wie wenn er einen Knollen im Rachen hätte.

Nachdem ich nun in kurzen Zügen die Symptome dieser Erkrankung und die Gründe, welche eine frühzeitige Operation verlangen, dargelegt habe, so bleibt mir, ehe ich zur Schilderung meines speziellen Falles übergehe, noch übrig, die Vortheile der subcutanen Oberkiefer-Refektion nach v. Langenbeck gegenüber den anderen Methoden darzulegen.

Die Wege, welche zu diesen Tumoren führen, sind verschieden:

1. Wurde der weiche Gaumen gespalten, und so vorgegangen; aber auf diese Weise einen Tumor zu exstirpieren, ist hart und schwer, weil es nicht immer gelingt, das Gaumengefäß zu schließen. Gelingt das aber nicht, so ist der Kranke von einem Uebel in das andere gestürzt, denn seine Sprache ist näselnd, unverständlich, er dient den Leuten zum Gespötte, sich selbst ist er eine Last.

2. Wurde der harte Gaumen gespalten, und so zum Tumor vorgedrungen, allein auch diese Methode hat ihre enormen Nachtheile, denn in den wenigsten Fällen gelang es, die Wiedervereinigung des harten Gaumens zu erzielen, eine Defekt blieb, was wieder vollkommen hinreicht, des Lebens überdrüssig zu werden.

Der Mund ist also, wie wir in den oben angeführten Methoden sahen, der erste, aber nicht beste Weg, der zu diesen Geschwülsten führt.

Der zweite Weg führt durch die Nase. Kleine Polypen können auf diesem Wege wohl entfernt, grofse aber nie und nimmer, weil der Spielraum zu klein ist.

Denn schon Verneuil behauptet, dafs zur gründlichen Beseitigung eines Nasenrachenpolypen die Bahnung eines ausgiebigen Zuganges zu letzten unerläfslich sei. Verneuil

führte vom inneren Augenwinkel der chloroformirten Patientin bis zur Nasenöffnung einen Schnitt, der von letzterer sich horizontal zum musc. masseter erstreckte. Nach Zurückschlagung des dreieckigen Lappens mit möglichster Ablösung des Periostes wurde mit einer Listonschen Zange die vordere Wand des scin. maxillar und des proc. front unter Schonung des Augenhöhlenrandes weggenommen, der Nasen- und Maxillartheil des Polypen mit Muffeux'schen Zange gefasst und indem von der Rachenhöhle her der Finger den Pharyngealtheil nach vorn drückte, das ganze fremde Gebilde ohne Schmerz und Blutung entfernt, endlich die Wunde durch Metallsuturen vereinigt.

Fleury zu Clermont extirpirte unter Abtragung eines Theiles des Oberkiefers mit bestem Erfolg einen Nasenrachen-Polypen, welcher nach einem Zeitraum von $2\frac{1}{2}$ Jahren nicht mehr gewachsen war.

Nach Genfouls Verfahren wurde der Oberkiefer abgetragen, so daß nun der Polyp, der sich an der hinteren Pharynxwand mit einem ungefähr 5 Markstück breiten derben Stiel inserirte, offen dalag.

Die Lücke'sche Methode, bei der bekanntlich der musculus masseter vom Jochbeine getrennt und dieser Knochen vorn durchfägt, hinten mit der Knochenzange durchschnitten, mit der fascia temporalis nach oben geklappt werden sollte, bedurfte einer Verbesserung. Lücke selbst und andere bedeutende Chirurgen äußerten den Wunsch, wegen der durch Narbencontraction bedingten Kieferklemme, welche manchmal längere Nachbehandlung noch verlangte, möge ein anderes Verfahren vorgeschlagen werden.

Braun schlug vor, den Hautschnitt wie Lücke zu führen, dann aber den Jochbogen nach Abtrennung der facia temporalis von seinem oberen Rande vorn zu durchfägen, hinten einzuknicken und mit dem intact gelassenen musc. masseter nach hinten unten zu schlagen. Professor Czerny führte 5 Operationen nach dieser Methode aus.

Die Wiedereinheilung des osteoplastisch resezierten und mit dem musc. mass. zurückgeschlagenen Jochbeins erfolgte meist ohne die geringste Dislocation in kurzer Zeit. Der Muskel war nicht im Stande, diesen Knochen nach unten zu ziehen, weil der Jochbogen nach seiner Reposition allein schon durch die bei seiner Einknickung hinten entstandene verzahnte Verkittung in seiner normalen Lage gehalten und 2. weil aber auch noch seine breiten Sägeflächen vorn fest aufeinandergedrückt wurden durch die Nähte, welche sowohl die fascia temporalis wieder an ihre Insertions-Punkte befestigt, als auch die Hautränder mit einander vereinigt. Ein Compressionsverband hat auch noch entschieden beigetragen zur Unterstützung des Knochens an seiner normalen Stelle. Eine Kieferklemme kam bei keinem der 5 Operirten vor, nach 10 bis 12 Tagen konnten sie den Mund um 2 cm öffnen und erlangten alle die volle Erweiterungsfähigkeit ohne besondere Nachbehandlung.

Was nun den Verlauf der Operation anlangt, so war ein Fall in 10 Tagen vollkommen geheilt und auch in dem Falle, bei welchem eine Eröffnung der Highmorshöhle stattgefunden hatte, erfolgte die Heilung in 3 Wochen. Die direkte Ligatur wurde nie angewendet, obwohl sie eigentlich am besten ist, weil dieselbe bei günstigeren lokalen Verhältnissen gelingen kann und dann jedenfalls die Heilung der Wunde reactionslos verlaufen wird. In kosmetischer Beziehung lieferte unsere Modification sehr gute Resultate, weil nur lineäre Narben an Stelle der Hautschnitte entstanden, während bei einigen nach der Lück'schen Methode Operirten eine tiefere Einziehung des horizontalen Schnittes in der Gegend des vom Jochbein abgeschnittenen musc. masseter zu Stande gekommen war, die im Laufe der Jahre etwas flacher wurde, aber nie mehr vollkommen verschwand.

Im Central-Blatt 1884 pag. 14 beschreibt Mikulicz 2 Fälle, welche nach der Gussenbauer'schen Methode operirt wurden.

Im ersten Falle handelte es sich um einen 14jährigen Knaben, bei dem bereits vor 2 Jahren ein Nasenrachen-Polyp mittelst der von Langenbeck osteoplastischen Resection entfernt worden war, jedoch ein Recidiv kam. Bei herabhängendem Kopf in tiefer Narkose spaltete Mikulicz den harten und weichen Gaumen, legte den erbrochenen, knöchernen Gaumen bei Seite, trug erst die untere Hälfte, dann die Basis des Tumors ab und entfernte das Periost der Schädel-Basis. Drei Wochen später wurde die Vereinigung des Gaumens vorgenommen; bis auf ein kleines granulirendes Loch in der Mitte des Gaumens trat Heilung ein.

2. Fall war ein 14jähriger Knabe, der in halbsitzender Stellung operirt wurde und zwar nur der vordere Theil des weichen Gaumens wurde gespalten. Die späte Naht hat große Vortheile, weil man die Operationsstelle überwachen kann; ebenso hat das Operiren bei herabhängendem Kopf bei jungen Individuen weit größere Vortheile.

Die Vortheile der Gussenbauer'schen Methode sind folgende:

- 1) Gewährt sie genügende Freilegung des Operationsfeldes,
- 2) verursacht sie keine Verunstaltung des Gesichtes,
- 3) läßt sie keine Funktionsstörung zurück.

Diese 3 Hauptvortheile der Gussenbauer'schen Methode sind im hohen Grade zu berücksichtigen.

Professor Simon entfernte im Jahre 1863 einen fibrösen, mit sehr vielen, varikös erweiterten Gefäßen durchsetzten Nasenrachen-Polypen durch die osteoplastische Resection des Oberkiefers und des Jochbeins. Dieser Fall lieferte den allerbesten Beweis, daß man durch die osteoplastische Resection des Oberkiefers und des Jochbeins Nasenrachen-Polypen entfernen könne, selbst wenn sie in die schwierigsten Zugangsstellen des sin maxillaris und der Umgebung ihren Sitz haben und zu sehr bedeutender Größe angewachsen sind.

Simon hält die totale Exstirpation des Oberkiefers nur

noch dann am Platze, wenn die zu exstirpirende Geschwulst den Gesichtstheil des Oberkiefers zugleich mit dem Alveolarfortsatz zerstört hat.

Simon befolgte die Langenbeck'sche Vorschrift, jedoch gelang es ihm nicht, die Nahtverbindung des Nasenfortsatzes des Oberkiefers mit dem Nasenbeine zu erhalten, sondern er lockerte sich in seiner Verbindung und brach dann total ab.

Anstatt ferner die Orbital-Platte von der fissura orbitalis inferior bis zum Thränenbein zu durchsägen, wobei die Thränen abführenden Organe gar nicht oder nur sehr wenig geschont werden, fügte Simon nach der mündlichen Angabe Langenbecks, von der genannten Fissur nach dem inneren Winkel des Orbitalrandes, durchtrennte diesen vor dem sulcus saccilacrymalis und darauf die Mitte des Nasenfortsatzes des Oberkiefers bis zum Nasenbein. Auf diese Weise wurde zwar bei weitem eine schmalere Knochenverbindung des resezierten Oberkiefers mit den Gesichtsknochen erhalten als bei ersterer Methode, aber dies hatte nicht den geringsten Nachtheil, wogegen durch Einhaltung dieses Schnittes die Thränen abführenden Organe sehr gut geschont werden und das lästige Thränenträufeln vermieden wurde, was doch unbestreitbar ein ganz enormer Vortheil ist und was die Kosmetik betrifft, gewiss in hohem Grade wichtig ist.

Simon behauptet, daß die von Langenbeck angegebene osteoplastische Resektion des Oberkiefers bei weitem vorzüglicher sei als die osteoplastischen Resektionen der Franzosen, da sie einen weiteren Zugang zur Nasen-, Rachen- und Kieferhöhle erlaubt, alle zum Schlingen, Kauen und Sprechen nöthigen Organe vollkommen schont und die meiste Aussicht zur schnellen Verheilung und möglichst geringen Entstellung bietet.

Dr. Bauchet berichtet von dem dauernden Erfolge einer im Jahre 1859 ausgeführten Operation. Der umfangreiche Nasenrachen-Polyp wurde mit der Quetschkette entfernt. Nach Abtragung des Oberkiefers wurde er total entfernt und die

Infertionsstelle energisch galvanokauterisirt. Bauchet glaubt, bei kleinen Polypen soll das os. maxill. super. nicht abgetragen werden und dies um so weniger, weil insbesondere bei alten Leuten die Gaumen-Defecte sich nicht mehr leicht ausgleichen, hat das Neugebilde nur die Gröfse einer Nufs, und ist es frei von Ausläufern nach der Nasenhöhle, nach dem sinus, nach dem unteren Rande des Gaumensegels, so räth Bichaut nur das Gaumensegel zu spalten, den Spalt jedoch offen zu lassen und auch offen zu erhalten, um den Tumor vielleicht zu vernichten und einem Rückfalle vorbeugen zu können; so zu lesen Schmidts Jahrgang 1864.

Michaux behauptet, wie Schmidt in seinem Jahrbuch 1865 schreibt, dafs die vollständige Resection des Oberkiefers der fast einzige zweckmäfsige therapeutische Eingriff sei bei Behandlung der Nasenrachen-Polypen.

Später aber, als er von Deroubaix angegriffen wurde, meinte er, er sei in seiner Behauptung zu weit gegangen.

Er verwirft weder die osteoplastische Operation, noch die Ligatur, noch die Kauterisation. Sind diese Operationen aber nicht hinreichend, so hält er die totale Resection des Oberkiefers für die einzige richtige Voroperation.

Deroubaix stellt die Ansicht auf, die Ligatur sei hier in der Regel die ausreichende Operation. Betrachten wir indess, dafs der Infertionspunkt der Nasenrachenpolypen keineswegs ein constanter ist, die Ausläufer des Gebildes und die mitunter äufserst fest secundären Adhäsionen derselben mit Genauigkeit zu bestimmen sehr oft unmöglich ist, so müssen wir die Ansicht Deroubaix entschieden für unrichtig halten.

Deroubaix und Michaux halten die Kauterisation für unzureichend, Nélaton benützt sie mit Vorliebe.

Maisonneuve ist dafür eingenommen, mit Aetzpfeilen die Geschwülste zu entfernen, um der Eiterinfection zu entgehen. Michaux hält auch dies für unzureichend. Er sucht den Polypen, nachdem er freigelegt ist, mit den Fingern zu

faßen und auszureißen. Widersteht er, so trennt er die Anheftung mit dem Messer, raspelt die Reste möglichst ab und kauterisirt die Insertionsstelle mit dem Glüheisen, um die Knochenhaut, den Mutterboden der Polypen, zu zerstören und eine oberflächliche Exfoliation des Knochens herbeizuführen. Wo er diesen Weg einschlug, erreichte er den vollsten Erfolg.

Ollier in Lyon hält bei breiter Insertion der Polypen, zumal wenn sie hoch oben in der Nasenhöhle stattfindet und mehrfache Verwachsungen vorhanden sind, die Resection des Oberkiefers für die einzige Voroperation, welche das Neugebilde mit Sicherheit zu beseitigen erlaubt und die Insertionsstelle desselben nachträglich gehörig und zwar so überwachen läßt, daß man im Nothfalle die Kauterisation noch vornehmen kann.

Ollier schlägt vor, das Periost des Oberkiefers abzulösen und zu erhalten, die Schneidezähne der erkrankten Seite stehen zu lassen, um die Lippe in ihrer normalen Lage zu erhalten und den Theil des Wangenbeines, welcher den Boden der Augenhöhle mitbilden hilft, zu schonen, um der das Aussehen so störenden Senkung des Auges vorzubeugen.

Richet stimmt Ollier bei, aber glaubt, daß die Erhaltung des Periosts nicht von wesentlichem Vortheil für die Einhaltung der Formen des Gesichtes sei. Er glaubt, daß die Erhaltung des Periostes die Operation schwieriger und Zeitraubender mache, ohne größeren Nutzen zu gewähren.

Poncet beschreibt, so zu lesen Schmidts Jahresbericht vom Jahre 1872 pag. 208, das Verfahren von Ollier, um große Nasenrachen-Polypen zugänglich zu machen.

Ollier führt einen hufeisenförmigen Schnitt, welcher am hinteren Rande eines Nasenflügels beginnt, bis zum höchsten Punkte des Nasendaches aufsteigt und auf der anderen Seite ebenso zum zweiten Nasenflügel herabsteigt. In dieser Schnitterichtung durchfährt er dann das knöcherne Nasengerüst und um die Nase bequem herunter klappen zu können, dann löst

er noch mit einem Meißelschlag die knorpelige Nasenscheidewand. Nach Entfernung der Geschwulst wird die Nase repouirt und mit den Weichtheilen befestigt. Die Wiedereinheilung erfolgt gewöhnlich in 14 Tagen.

Professur A. Desgranges in Lyon stellt die Behauptung auf, wie es im Schmidts Jahresbericht 1873 Seite 163 steht, in den meisten Fällen könne man ohne jede Zerstörung zu den Nasenrachenpolypen gelangen.

Desgranges wendet folgendes Verfahren, das aus 3 Zeiträumen besteht, an:

Zunächst muß der Isthmus faucium so erweitert werden, daß das Spiel der Instrumente im Cavum pharyng. erleichtert wird. Zu diesem Zwecke wird hinter dem Velum ein breiter Faden herumgeführt, dessen Enden zum Mund und zur Nase herausgehen und die auf einer Pflasterrolle über der Oberlippe fest zusammengebunden werden. Hierdurch wird der Isthmus vergrößert, so daß man bequem aus dem Mund in die Rachenhöhle gelangen kann.

Behufs Zerstörung von Nasenrachenpolypen wird vom Mund aus nach der Nase ein Faden eingeführt, der das Zuführen einer Schlinge von Metall oder Darm gestattet. Dies soll dazu dienen, die Basis der Polypen zusammen zu schnüren, selbst wird es mit Hilfe eines kleinen speziell dazu construirten Ecraseurs bewirkt. Zur Verhütung der Recidive wendet er Chlorzink an. Alsdann verschließt er die Nasenhöhle von hinten her mit Charpie, führt in das Nasenloch einen fischbeinernen Löffel ein und unter dem Löffel einen metallenen Spatel und befestigt beides mit Hilfe eines im Gelenke senkrecht stehenden Stabes an einer Stirnwand. Dieser Apparat bleibt 4—5 Stunden liegen. Professor Desgranges hat dieses Verfahren in 5 Fällen mit sehr günstigem Erfolge erprobt.

Nélaton gab auch eine eigens doppelt gebogene Zange an, um die Polypen von ihrem Ansatzpunkte am Oberkiefer

abzwicken zu können. Er hat zuerst im Jahre 1864 die Behandlung eines Nasenrachenpolypen durch electrolytische Behandlung beschrieben. Zur Ausführung der Electrolyse bedarf man einer Batterie, die das Ein- und Ausschalten von Elementen während der Action gestattet. Entweder werden beide Nadeln oder nur die der negativen Electrode eingefenkt, in welch' letzterem Fall die positive mit einer Schwammkapsel armirte Electrode in der Hand gehalten oder auf die Wange applicirt wird.

Tripiers Befürchtung, dafs bei Application nadelförmiger Electroden sich die Aetzwirkung auf die basis cran. erstrecken werde, bestätigte sich nicht.

Wegen der Nähe des Gehirns und der grossen Nervenstämme mufs man längere Zeit schwache Ströme anwenden. Groh empfiehlt es besonders. Galvanopunktur wird hauptsächlich durch die Aetzwirkung bedingt. Die Abstoßung des Schorfs geschieht in kleineren Parthien, zuweilen kommt es auch zur Elimination gröfserer sequestrirter Stücke. Hierzu tritt der Ulcerationsprocefs, der zu weiterer Verkleinerung und Schrumpfung Anlaß gibt. Trotzdem scheint noch eine sogen. katalytische und dynamische Wirkung stattzufinden, wie z. B. in einzelnen Fällen einzelne Geschwulsttheile, die nicht direkt getroffen waren, oder die erst eine Zeit lang nach der Application verschwinden. Der Apparat ist aber sehr theuer, was natürlich ein grofser Nachtheil ist. Nach Gußenbauer ist von den zur Freilegung des Operationsfeldes erforderlichen Voroperationen die subcutane Oberkiefer-Resection nach von Langenbeck die beste, weil sie den besten Zugang und die geringste Entstellung macht.

Im Schmidt Jahresbericht 1881 bemerkt Dr. Heinrich Schmid epikritisch, dafs die Gußenbauer'sche Methode vor den übrigen Verfahren (Michaux, Demarquais, Chaffaignac, Després, Ollier, Bruns, Langenbeck, Linhart, Gautier, Péan) aufser der auch von anderen

anerkannten relativ freiesten Zugänglichkeit zum Operationsgebiet und der Vermeidung einer jeden functionellen Störung der durch die Operation direkt getroffenen Theile, fowie jeder Gesichtsentstellung noch eine große Sicherheit gegen Recidiven bildet, weil unter der Controle des Gesichtsinnes operirt wird und die Geschwulst sammt ihrem Mutterboden, dem Periost, entfernt werden können. Außerdem ist die Blutung so gering, daß der Kranke ohne Vorkehrungen gegen das Herabfließen des Blutes in den Larynx geschützt werden kann.

Die Technik selbst ist eine relativ einfache und endlich läßt sich das Operationsgebiet bis zur vollständigen Uebernarbung wochen-, ja monatelang überwachen. Diese Vortheile bewogen Prof. Gussenbauer zur Anwendung des Verfahrens auch bei malignen, vom Rachendach oder dessen Umgebung ausgehenden Neubildungen.

Bardleben sagt, die von Langenbeck empfohlene Methode gewährt nicht nur in solchen Fällen, in welchen eine partielle Resection hinreicht, noch größere Bequemlichkeit, sondern gestattet weitere Operationen im Pharynx und in der fossa sphenomaxillaris fast in dem Umfange, wie die wirkliche Entfernung des ganzen Oberkiefers.

Die Einheilung erfolgt voraussichtlich, da für die Ernährung des temporär ausgelösten Knochenstückes durch die ihnen adhärent bleibenden Weichtheile und für die erforderliche Blutzufuhr zu diesen durch die unverfehrt gebliebene Brücke am processus nasalis hinreichend geforgt ist.

Dr. Hueter sagt: Wenn man den hinteren Abschnitt der Nasenmuscheln oder sogar das Labyrinth des Siebbeins freilegen will, so muß man sich zu osteoplastischen oder temporären Resectionen des Nasenskelets entschließen.

Die älteste Methode dieser Resectionen hat von Langenbeck angegeben; sie stellt sich die Freilegung einer Nasenhöhle zur Aufgabe. Zu diesem Zwecke führte man von der Spitze des betreffenden Nasenloches bis zur Nasenwurzel einen

Schnitt, welcher genau dem Nasenrücken entspricht und im vorderen Theile auch den Nasenknorpel trennt. — Ein zweiter Schnitt läuft vom Winkel des Nasenflügels ebenfalls nach oben zur Nasenwurzel und zwar in der Linie, in welcher sich die Nase von der Wange abtrennt. Auch dieser Schnitt trennt mit den Weichtheilen zugleich den Nasenknorpel bis zum Rande des knöchernen Nasenskelets. Man kann auch, wie es von Langenbeck in den letzten Operationen dieser Art geschehen ist, den Rand des Nasenlochs unverfehrt lassen, indem man beide Schnitte erst einige Linien hinter dem Rande des Nasenflügels beginnt und diese Punkte alsdann mit einem Querschnitt verbindet. Nun ergänzt man im Nasenskelett die Trennung der Weichtheile dadurch, daß man mit der Stichsäge median die beiden *ossa nasi* trennt und an der Seite, wieder entsprechend dem Schnitt, durch die äußere Haut den *proc. nasalis* des Oberkiefers vom Körper bis zum Thränenbein abtrennt. Mit einem starken Elevatorium hobelt man nun den Lappen, welcher von den beiden Schnitten eingegrenzt ist, nach oben gegen die Stirne empor, wobei das *os nasi* und der *proc. nasal.* des Oberkiefers in ihrer Nahtverbindung mit dem Stirnbein sich lockern und der Abhobelung folgen. So wird temporär der Knochen-Knorpel und Weichtheildeckel, welcher die betreffende Nasenhöhle zudeckt, entfernt; man kann nun die Polypen, indem man die Muscheln und das Labyrinth des Siebbeins deutlich überfieht, entfernen und klappt endlich den Deckel von der Stirn nach unten zurück, um ihn in seiner normalen Stellung durch genaues Vernähen der beiden Schnittwunden in der äußeren Haut zu befestigen. Die Heilung der äußeren Wunden, auch der Knochenwundflächen, erfolgt ohne Störung. Die Narben sind wenig oder fast gar nicht entstellend, weil die eine Narbe genau auf den Nasenrücken fällt, die andere genau in die Grenzlinie zwischen Nase und Wange zu liegen kommt. —

Nachdem ich nun verschiedene Methoden angeführt, die

Vortheile der Langenbeck'schen Methode eigens berücksichtigt habe, komme ich zu meinem speciellen Krankheits-Falle. —

Mendler Karolina, Söldners-Wittwe von Allusried, 45 Jahre, wurde am 17. April 1885 ins städtische Krankenhaus l./I. aufgenommen.

Aus ihren Angaben ist folgendes zu entnehmen:

Patientin war seit 1871 verheirathet und ist nun seit 7 Jahren Wittwe: von 7 dieser Ehe entsprossenen Kindern sind noch 4 am Leben, 3 wurden todt geboren; Geschwister der Frau sind sämmtliche gesund, Vater an Altersschwäche, Mutter an Wässerfucht gestorben. Mendler ist von kräftiger Constitution. Patientin gibt an, seit August vorigen Jahres fortwährend an Rachenkatarrh gelitten zu haben, gegen welchen ein zu Rath gezogener Arzt Gurgelwasser verschrieb. Seit Weihnachten bemerkt sie eine Raumbengung der hinteren Rachengegend; seit dieser Zeit verspürt sie auch Luftmangel, da die Athmung durch die Nase beschränkt und allmählig nun ganz unmöglich geworden ist. Das Gehör ist seit dieser Zeit merklich schlechter geworden, man muß sehr laut sprechen, wenn es die Patientin verstehen soll. Die Athmungsbeschwerden wurden von Tag zu Tag größer, Patientin hat fortwährend den Mund geöffnet und ringt nach Luft, ihr Blick ist ängstlich. Seit den letzten Tagen bekommt Patientin des Tages öfters heftiges Nasenbluten, woran sie früher nie gelitten haben will.

Status praesens:

Patientin ist zur Zeit anämisch, die rechte Gesichtshälfte scheint etwas hervorgehoben zu sein, der rechte Augapfel scheint mehr aus der orbita hervorzureichen als der linke, erscheint daher auch größer. Rechte Nasenhöhle vollkommen verstopft, linke auch, aber nicht so vollkommen. Ihr Blick ist matt, ihr Aussehen schläfrig; sie ist ziemlich apathisch gegen alles, was in ihrer Umgebung vor sich geht. Die

Sprache ist vollkommen klanglos, äußerst schwer, öfters überhaupt gar nicht zu verstehen, sie redet, wie wenn sie einen Knollen im Rachen hätte. Sie bemerkt das selbst am besten, denn sie spricht nur, wenn man sie fragt, aus eigenem Antriebe oder um etwas zu erfahren von den anderen im Saale liegenden Patientinnen, redet sie nichts. Das Gehörvermögen ist so bedeutend heruntergesetzt, daß man beinahe schreien muß, um es ihr verständlich zu machen, was man mit ihr will. Ihre Antworten sind karg und unklar, fortwährend ist Rasseln beim ganz gewöhnlichen Athmen zu vernehmen, das dem Schnarchen eines im tiefen Schlafe liegenden Menschen sehr ähnlich ist.

Die Inspection des Rachens ergibt folgende Verhältnisse:

Der Gaumenfelgel steht in der Ebene der letzten Molar-Zähne und bildet mit dem harten Gaumen einen rechten Winkel und ragt herab bis zum Zungengrund, so daß die Rachenhöhle vollkommen verdeckt ist. Drückt man mit einem Spatel die Zunge stark nach unten, so sieht man das Zäpfchen und die Gaumenbögen vollständig normal. Bei der Betastung der Rachengegend, deren Sensibilität herabgesetzt ist, denn Patientin reagirt fast gar nicht, fühlt man einen mit dem Gaumenfelgel verwachsenen Tumor, von mäßig weicher Consistenz, der einen vollständigen Verschluss der Choanen bewirkt und die Schleimhaut der oberen Rachengegend, von der er ausgeht, weit nach unten und ungefähr bis zu einer horizontalen durch die hinteren unteren Molar-Zähne gelegte Ebene herabgedrängt hat. An den Seiten kann man die Rachenhöhle noch etwas weiter nach oben verfolgen, so daß der Tumor einen mit der Convexität nach unten gerichteten Bogen bildet. Der Tumor ist überall gleichmäßig consistent und mit der Rachenschleimhaut verwachsen.

Da auch, so lange die Frau sich im Krankenhaus befand, starkes, ja gefährliches Nasenbluten auftrat, so war die Operation dringend angezeigt. Herr Geheimrath Prof. Dr. v. Nufs-

baum wählte die Langenbeck'sche Methode, weil nach seiner Ansicht das abgesprengte Oberkiefer wie eine einfache Fractur heile. Er bediente sich ferner der Rose'schen Verbesserung d. h. er schlug bei herabhängendem Kopfe die Operation vor, weil hier ganz wenig oder gar kein Blut in die Lungen dringe, keine Pneumonie, keine Erstickungsgefahr drohe. Ferner hob er hervor, daß die Operation so schnell als möglich gemacht werden soll, weil die Blutung im geraden Verhältniß zur Dauer der Operation stehe. Die Blutung ist bei dieser Operation gewöhnlich sehr stark, jedoch nicht zu fürchten, da die Blutung von selbst aufhöre, ohne daß irgend etwas dagegen geschieht.

Die Operation muß trotz der wenig gefährlichen Blutung rasch vor sich gehen, weil für den Augenblick der Patient einer recht großen Anämie unterliegen könnte.

Am 27. April Morgens $1\frac{1}{2}$ 9 Uhr wurde genannte Frau chloroformirt; nachdem sie vollkommen narkotisirt war, wurde sie mit herabhängendem Kopfe dem Operateur gegenüber auf den Operationstisch gelegt und Herr Geheimrath begann unter Anwesenheit einer großen Anzahl von Studirenden mit der Operation, dabei fixirte ein Assistent fest den herabhängenden Kopf.

1. Schnitt von der Nase ausgehend parallel dem Infra-orbitalrand bis zum Jochbogen.

2. Schnitt von der r. Nasenöffnung parallel mit dem ersten Schnitt wieder zum Jochbogen.

3. Schnitt ist ein Vertikal-Schnitt, der die Vereinigung der beiden ersten zur Folge hat. —

Nun wird der musc. masseter vom Jochbogen abgelöst und die Kettenfäse um den Jochbogen herumgeführt und der Jochbogen durchfägt. —

Alsdann wurde das Periost an der Orbita losgelöst, mit der Kettenfäse der Jochbogen, mit der Stichfäse der Boden der Augenhöhle durchfägt. Dann ging Herr Geheimrath mit

der Stichfäße in die rechte Nasenöffnung ein und trennte den unteren Theil des Oberkiefers vom oberen Theile, alsdann wurde ein Meißel in die Kettenfägewunde des Jochbogens eingesetzt und während der linke Daumen das stehenbleibende Stück des Jochbogens stützte, mit dem Meißel das ausgefägte Oberkiefer vom Keilbein abgehebelt und abgebrochen. War das nun geschehen, so wurde das Oberkiefer auf die andere Seite gelegt, und es hatte den Anschein, wie wenn der Deckel einer Dose einfach zurückgeklappt wäre. Bis hierher ging die Operation ganz gut vor sich, Patientin röchelte ziemlich stark, Athemnoth und deren Anzeichen waren nicht vorhanden, Puls war kräftig, Blutung jedoch ziemlich stark und von Secunde zu Secunde wurde sie stärker. Die Zunge mußte mit der Zange gefaßt und fixirt werden, da sie nach rückwärts fiel und so Erstickung gedroht hätte. Die bereits gemachte Oeffnung mußte mit Meißel und Hammer noch erweitert werden, um einen besseren Zugang zum Tumor zu haben. Auf einmal athmete genannte Frau schlecht, setzte sogar aus, die Blutung steht, mit der Operation mußte $\frac{1}{2}$ Minute ausgesetzt werden. Alsdann erholte sich die Frau wieder und die Zugangsöffnung führte bequem zum Fibroid. Herr Geheimrath suchte es mit den Fingern herauszubekommen, allein es glitt in die Rachenhöhle bis zum Kehldeckel, es musste mittelfst Zange gefaßt werden und die momentane Cyanose, welche durch das Hinabgleiten des Tumors auf den Kehldeckel entstand, war sofort verschwunden. In 20 Minuten war das Fibroid entfernt. Die Blutung dauerte noch 30 Sekunden und stand durch Anwendung eines Tampons. Patientin athmet ganz ruhig und leicht, ihr Gesicht bekommt eine schöne rothe Farbe, der Haupttheil der Operation ist hiemit beendigt. —

Der eingelegte Tampon erhielt einen Faden angehängt, der durch die Nase führte und mittelfst dessen er am folgenden Tage entfernt wurde. Alsdann wurde die Wundfläche all-

seitig ein wenig mit einem Jodoform-Dutzel bestrichen, der zurückgeklappte Oberkiefer in seine normale Lage gebracht und die Vereinigung der Hautwunde mittelst Naht vorgenommen. Eine grobe Naht stellte die Vereinigung mit dem Jochbogen wieder her, dagegen eine feine Naht das Zusammenhalten mit der Orbita. (Knopf und Kirschnernaht.) So blutig und so gefährlich die Operation auch aussieht, so wenig gefährlich ist sie, die Blutung hört ja von selbst auf, in unserem speciellen Falle bedurfte es nicht einmal einer Ligatur. Allerdings sind die guten Nähte, die angelegt werden mußten, zugleich ein Blut stillendes Mittel. Nachdem die Vereinigung durch die Naht hergestellt, Patientin von der durch die Operation hervorgerufenen Verunreinigung und Befudelung mit Blut gereinigt war, war die Entstellung eine ganz geringe. Es wurde ein antiseptischer Verband angelegt, was für einer gewählt wird, ist gleichgültig. In unserem vorliegenden Falle wurde zuerst eine Schichte Jodoformgas auf die vereinigte und mit Jodoform betupfte Hautwunde gebracht, darüber eine Schichte Salicylwatte mit Guttapercha-Papier und das Ganze mit einer Binde befestigt. —

Die ganze Operation währte sammt Anlegung des antiseptischen Verbandes 30 Minuten, gewiss eine kurze Zeit für eine so blutig aussehende und so gefährlich scheinende Operation. Die Kranke war noch nicht von der Narkose erwacht, als sie vom Operationstisch auf den Krankenfaal gebracht wurde. Jedoch nach einiger Zeit erwachte sie und äußerte gar keine Klagen. Patientin athmet jetzt ruhig und kräftig, verfiel jedoch bald wieder in einen kräftigen, längere Zeit andauernden Schlaf, aus dem sie erst nach einigen Stunden erwachte. Nachblutung trat keine auf, die Temperatur stieg nie höher am Tage der Operation als bis auf 38,3, so daß berechtigte Hoffnung vorhanden war, die Kranke werde ohne hohes Fieber geheilt. — Am Abende des 27. Aprils wurde der Verband erneut.

28. April.

Patientin schläft des Tages über sehr viel, zeigt sich noch etwas apathisch, sieht etwas anämisch aus, die rechte obere Halsgegend ist leicht ödematös geschwellt, aus der Nase entleert sich seröse etwas mit Blut vermischte Flüssigkeit; die Athmung ist ruhig und sicher, der Mund ist stets ein wenig geöffnet, Puls ist 96, frequenter als normal, jedoch kräftig und voll. Die Morgentemperatur beträgt 37,2, die Abendtemperatur 38,6. Ihre Nahrung besteht aus leerer Suppe, die sie gerne und mit Appetit aufnimmt. Das Kauen und Sprechen wird auf jede Art zu vermeiden gesucht, um die operirte Stelle zu schonen und nicht auf unüberlegte Weise den so günstigen Verlauf zu beeinflussen.

29. April.

Dieser Tag war wohl der schlimmste von allen vorausgegangenen und nachfolgenden; die Temperatur erreichte eine Höhe von 39,1 und die Durchschnittstemperatur war 38,6. Die Kranke war an diesem Tage sehr schwach, der Puls außerordentlich frequent. Schmerzen äußerte die Frau jedoch sehr wenig, ihr Appetit war auch der gleiche, der Ausfluß aus dem rechten Nasenloche war eiteriger Natur. Die Nacht vom 29.—30. April verlief jedoch wieder sehr gut, Patientin schlief die ganze Nacht. —

Am 30. April und 1. Mai hatten wir eine Durchschnittstemperatur von 38,5. Vom 2. Mai fiel die Temperatur und erreichte nie mehr einen höheren Grad als 37,2.

Patientin wurde von Tag zu Tag besser, ihre Apathie verschwand allmählig und machte einer leidlichen Munterkeit Platz, so daß sie sich äußerte, sie sei sehr zufrieden mit ihrem Zustande, sie athme wieder so leicht als früher, wo sie noch gesund war, sie habe Appetit, Schmerzen habe sie beinahe gar keine mehr; der Ausfluß aus dem rechten Nasenloch sei absolut nicht übelriechend, werde von Tag zu Tag geringer und habe den

Charakter eines eiterigen Ausflusses verloren und neigte sich mehr einer seroes aussehenden Flüssigkeit zu.

Der Puls war in den letzten Tagen zwar frequent, jedoch von guter Beschaffenheit, die Herzaktion noch etwas erregt, die Töne jedoch rein. Bisher bekam sie immer nur flüssige Nahrung, die ihr sehr gut schmeckte und die sie auch sehr gerne aufnahm.

5. Mai.

Patientin ist heute ganz munter, hat einen ganz guten Puls, dessen Schlagzahl ungefähr 72 beträgt, hat gar keine Schmerzen mehr, sehr guten Appetit, kann den Mund ungefähr schon 2 ctm öffnen. Die äußere Wunde ist unter dem täglich einmal gewechselten antiseptischen Verband wunderschön geheilt, eine Nach-Operation war nicht nöthig; spricht jetzt deutlich und verständlich, hat das normale Gehörvermögen wieder erreicht und nimmt starken Antheil an allem, was sich in ihrer Nähe abspielt.

9. Mai.

Puls ist heute frequenter als gewöhnlich, in der Minute ungefähr 90 Schläge. Die Beschaffenheit des Pulses ist eine kräftige, volle. Äußere Wunde ist vernarbt, wir haben keine Nachblutung bekommen; die Frau kann gut essen und trinken, ohne Beschwerden, sieht frisch und gesund aus, redet ganz verständlich, ist mit den Worten nicht mehr so karg, ihre Sprache durchaus nicht mehr näselnd, sondern voll und kräftig, die Vocale sind rein und klar. Bei der Nacht schläft Patientin sehr gut, hat keine schweren Träume, die Temperatur ist ganz normal, Patientin ist mit ihrem Zustande in jeder Hinsicht sehr zufrieden.

Am 14. Mai verließ die operirte Frau das Krankenhaus, um nach Hause zu reisen; ihr Zustand war so, daß man sie ohne jedes Bedenken in die Heimath entlassen konnte. Die so blutig aussehende Operation, die auf dem Operationstisch viel graufamer ausah als sie ist, hinterließ äußerlich nur

2 lineäre Narben die durch eine vertikale Narbe vereinigt waren. Die rechte Gesichtshälfte trat nicht mehr so hervor, sie war der gefunden linken ganz ähnlich; es hatte nicht mehr den Anschein als wie wenn der rechte bulbus hervortrete, der Blick war nicht mehr so matt und müde, als wie vor der Operation, das Rasseln beim Athmen war vollkommen verschwunden, das Athmen selbst ruhig und sicher, keine Athemnoth war zu constatieren, die Patientin bekam nun wieder durch die Nase Luft und fühlte sich ganz glücklich. Man brauchte nicht zu schreien um von der Patientin verstanden zu werden, ihr Gehörvermögen wurde wieder so normal, daß sie auch die leiseste Frage rasch beantwortete. Das Essen ging leicht und rasch vor sich, Patientin verschluckte sich nicht mehr. Das lästige ja unstillbare Nasenbluten, das die Operation so dringend machte, hatte vollkommen aufgehört und trat während der 17 tägigen Behandlung nie mehr auf. Die Operationsmethode nach v. Langenbeck mit der Rose'schen Verbesserung hatte in unserem speziellen Falle den glänzendsten Erfolg gebracht.

Was nun die Geschwulst anlangt, war es ein Fibroid, das wie Herr Geheimrath Professor Dr. v. Nussbaum diagnosticierte, von der Schädel-Basis ausging und sich zwischen Nase und Wirbelsäule herab erstreckte, die linke und rechte Nasenhöhle ausfüllte und so den Zugang der Luft durch die Nase vollkommen abschloß.

Das Fibroid bestand makroskopisch aus 2 Theilen, einem weitaus größeren und einem kleineren, letzterer war durch eine Furche in zwei Abtheilungen getheilt, von denen jede an Größe wohl so ziemlich gleich war. Die ganze Geschwulst hatte die Größe eines kleinen Hühnereies, einem Quersack ähnlich, von gelblich-röthlichem blaffen Aussehen, mit einer glatten, glänzenden Oberfläche, auf der einzelne oberflächliche Gefäßverzweigungen von nicht zu unterschätzendem Kaliber makroskopisch zu sehen waren.

Die mikroskopische Untersuchung, deren Resultate ich durch die Güte des Herrn Conservator Prof. Dr. Bollinger erhielt, ergibt folgendes:

Der Tumor ist histiologisch aus zwei ziemlich scharf getrennten Geschwulstarten zusammengesetzt. Der kleinere Theil der Geschwulst, welcher makroskopisch aus einem mehr grauen durchscheinenden und stark saftig glänzendem Gewebe besteht, zeigt mikroskopisch die Eigenschaften und Charaktere eines Myseo-Sarkoms; in dem Schleim- und sparsamen Stützgewebe finden sich gleichmäßig eingestreut überaus zahlreiche rundliche und meist ovale Zellen mit gleichmäßig großem runden Kerne. Dieser Theil der Geschwulst, welcher an einzelnen Stellen eine mäßige Zahl von Gefäßen enthält, zeigt alle Eigenschaften und Charaktere des jugendlichen, sehr zellenreichen Bindegewebes, der übrige Theil der Geschwulst und zwar die größere Hälfte desselben, schneidet sich ziemlich derb, ist von milchweißer Farbe, auf der Schnittfläche trübe, undurchsichtig, weniger saftreich. Diese Parthie zeigt mikroskopisch ein faferiges, zellenartiges Bindegewebe, kurz alle Eigenschaften und Charaktere des ächten Fibroms. Die ganze Geschwulst ist außen von einer dünnen Schicht Pflaster-Epithel bedeckt. Aus diesem Untersuchungsresultate ergibt sich die Diagnose einer Mischgeschwulst und zwar eines Fibro-Sarkoms.

Es sei mir nun an dieser Stelle gestattet, noch einige Worte über die Nasenrachen-Polypen zu sprechen.

Von wo sie entspringen, habe ich bereits an früherer Stelle erwähnt.

In Cannstatt's Jahresbericht 1855 Band IV pag. 199 sucht Prof. Dr. v. Pohl in Greifswalde die alt hergebrachte und oft wiederholte Meinung zu widerlegen, daß der größte Theil der Oberkiefergeschwülste durch schlechte Zähne, oder ungeschickte ausgeführte Operation, an demselben entständen. Gewöhnlich ist die Oberkieferkrankheit schon in vollständiger Ausbildung bis der Kranke es für nöthig hält sich einen Zahn

zu reifen. Rachenpolypen verbreiten sich eigenthümlich, nach Zerstörung der hinteren Wand des antrum Highmori kommen sie in das antrum Highmori hinein, in die beiden Nasenhöhlen durch Zerstörung des septum narium. Die knöchernen Geschwülste sind als circumscripte oder allgemeine Hypertrophien des antrum Highmori aufzufassen, die sich bis zur vollständigen Ausfüllung dieser Höhle entwickeln können. Die carcinomatoesen entstehen immer in der spongiosen Substanz der Knochen des Keilbeines und der basis cranii und verbreiten sich von hier aus nach dem antrum Highmori, nach der orbita u. f. w. Man kann sie nie vollkommen exstirpiren, immer kommen Recidiven. Beim Carcinom sind die Oberkieferknochen erweicht, nachgiebig, der harte Gaumen wird elastisch, blutreicher, das Zahnfleisch ist auch blutreicher und angeschwollen, die Zähne sind unregelmäßig gestellt, gelockert, hervorragend. Bei knöchernen Geschwülsten Crepitation fast nie ragen diese in die Mundhöhle hinein durch Vordrängen des proc. palat.

Nélaton hat sich ausdrücklich dahin ausgesprochen, daß fibroese Tumoren an der Schädelbasis eine Krankheit junger Leute sei. Demarquay fand in Uebereinstimmung hiemit unter seinen gesammelten Fällen als höchstes Alter 36 Jahre.

Demarquay stellte folgende Sätze auf:

1) Die Nasenpolypen können bis in den pharynx reichen, das Gaumensegel verdrängen, die tuba Eustachii verlegen und können von der Schädelbasis ausgehend Nasenrachen-Polypen simulieren.

2) Sie können durch Verdrängung der unteren Orbitalwand den Augapfel verdrängen.

3) Mit Kopfschmerz, Somnolenz, zeitweisem Verlust des Bewußtseins gehen sie einher. Gerade diese Erscheinungen kommen sämmtliche auch bei Nasenrachenpolypen vor, aber ihre Erklärung finden sie in der gestörten Respiration und Circulation des Blutes, ohne daß sie durch Verlagerung des Tumors bis in die Schädelhöhle bedingt zu sein scheinen.

Cruveillier, der die fibroesen Polypen der Schleimhäute, Fibrophyten nannte, versteht unter jenen fibroesen Geschwülsten bald gestielte bald mit breiter Basis versehene mit einer verdünnten, aber fest aufsitzenden Schleimhaut bedeckte Geschwülste und stellt die fibroesen von Periost ausgehenden Polypen der Nase und das pharynx als verwandt mit anderen von Periost ausgehenden z. B. mit den von an der Wirbelsäule entspringenden auf. v. Langenbeck beschrieb ein Fibroid der fossa pterygo-palatina, betrachtet aber diese Art von Geschwülsten als wesentlich verschieden von dem Nasenrachen-Polyp.

Robert sagte, daß die mit breiter Basis aufsitzenden, die Höhle wo sie entstanden, nicht verlassende Geschwülste als fibroese Körper bezeichnet werden, dagegen die gestielten, auf der Schleimhaut mehr oder weniger hervorragenden fibroesen Geschwülste in der Regel zwar Polypen genannt werden, daß er aber einen wesentlichen Unterschied zwischen beiden Arten nicht fand.

Michaux nennt alle in der Nasen- und Rachenhöhle vorkommenden fibroesen Geschwülste ohne Rücksicht auf die Umkleidung, Gestaltung und Insertionsstelle zu nehmen, Nasenrachenpolypen.

Deroubaix behauptet, daß diese Geschwülste zum größten Theile von dem vorderen Theile des proc. bas. oss. occipitis und dem ihm angrenzenden Theile des corp. oss. sphenoidal ausgingen und die weitere Verbindung mit den anliegenden Flächen consecutiver Natur sei.

Cruveillier und Nélaton gaben an, daß der Nasenrachen-Polyp meist vom oberen Bogen der Rachenhöhle und zwar in der Regel, wie auch andere Autoren übereinstimmen, von einem einzigen Punkte des Periost ausgehen, aber doch möchte Michaux die Möglichkeit nicht in Abrede stellen, daß 2 verschiedene Punkte zu einer Hypertrophie sich geeignet zeigen und von diesen Geschwülsten ausgehen, die sich später zu einer Geschwulst vereinigen. Zieht man ferner in Betracht,

dafs Cruveillier einen Polypen von 2 Rückenwirbeln ausgehend beobachtete, dafs Virchow einen Polypen beschrieb, der am 3. und 4. Rückenwirbel inseriert war, ohne mit dem Zwischenwirbelknorpel verwachsen zu sein, so ist jedenfalls kein Grund da, warum an den Halswirbeln fibroese Geschwülste nicht in ganz gleicher Weise vorkommen können, welche Muskeln und Aponeurosen verdrängend, in die Rachenhöhle hinein eine Hervorragung bilden und alle Eigenschaften von Polypen annehmen können. Wo eben der geringste Widerstand ist, dorthin breiten sie sich aus.

Panas gibt an, dafs die die Nasenhöhle auskleidende Schleimhaut in der Nähe der Choanen fast fibroes werde. 2 Mal hat er Polypen entfernt, die ihren Sitz in dieser Gegend hatten. Der eine hatte seine Insertion an der tuba Eustachii, der andere war vom unteren Rande des Vomers ausgegangen und erfüllte den pharynx. Im Schmidt's Jahrbuch 1879 Seite 275 steht folgendes:

Bens sucht die Aetiologie in einer irre geleiteten Entwicklung des Schädels in der Weise zu suchen, dafs das Periost der vorderen Fläche der Cerebral Wirbel aus unbekannten Ursachen, an einer circumscribten Stelle unfähig geworden ist, Knochengewebe zu entwickeln und durch das physiologische plus von Ernährungs-Material in einen hypertrophischen Zustand versetzt wird. Daraus ergaben sich folgende Sätze:

1) Nach Abschluß der Schädel-Entwicklung hören auch die Recidiven auf.

2) Mit dem allmählichen Abschluß der Schädel-Entwicklung geht Hand in Hand die Rückbildung eines etwa vorhandenen Nasenrachen-Polypen.

3) Ohne Verbindung mit der Wurzel sind die Fortsätze trotz etwa bestehender dicken Verwachsung mit den benachbarten Theilen nicht im Stande, weiter zu wachsen, vielmehr steht zu erwarten, dafs sie unbemerkt verkümmern.

4) Man hat die Radical-Heilung nur dann in seiner Gewalt, wenn man mit aller Sorgfalt die Infertionsstelle zerstört.

Bens zeigt, daß die pathognomische sogenannte spontane Blutung der Nasenrachen-Polypen und die ihre Operation begleitende Hämorrhagien nicht aus den Gefäßen der Polypen, der blutärmsten Geschwülste, sondern aus den Gefäßen der sie überziehenden Schleimhaut stamme. Die Andauer und schwere Stillbarkeit der Blutung wird dadurch bedingt, daß das unterliegende fibroese Gewebe sich contrahiere und die Gefäß-Lumina weit auseinander zerre.

Bisher habe ich nun die Anwendung der v. Langenbeck empfohlenen Oberkiefer-Resection zu Entfernung von Geschwülsten im Nasenrachen-Raum beschrieben, habe die verschiedenen Methoden anderer hervorragender französischen und deutschen Chirurgen in kurzen Zügen beschrieben und habe auch die Fibroide als solche kurz angeführt was ihre Aetiologie anlangt. Nun bleibt mir noch übrig auf die 2. Anwendung der Langenbeck'schen Oberkiefer-Resection kurz einzugehen.

Sie wird nämlich nicht nur gemacht zur Entfernung von Tumoren, sondern auch bei heftigen Neuralgien, um den 2. Ast des trigeminus vom foramen rotundum wegzunehmen. Der Schmerz hört dann gewöhnlich auf oder wird wenigstens auf lange Zeit gestillt, weil man den Nerven unmittelbar an dem Ausgangspunkte aus dem Gehirn nämlich dem foramen rotundum refeciren kann, was erfahrungsgemäß mehr Vortheile verspricht, als wenn man weit entfernt vom Gehirn ein Stück vom Nerven refeciert.

Im Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte der gesammten Medizin, herausgegeben von Virchow und Hirsch, IV. Jahrgang 1869 II. Band Seite 430 beschrieb Podrazki eine Recidive-Neuralgie, wegen welcher schon früher eine Neurectomie des nerv. infraorbit. in dem gleichnamigen Kanale, dann als 15 Monate später eine Recidive kam, von Patruban ohne allen Erfolg die arteria carotis

unterbunden worden war. Podrazki führte die Refection des 2. Astes des trigeminus nach der Methode von Canochan aus. Er legte den Nerven durch partielle Refection des Oberkiefers bis zum foramen rotundum frei und machte kurz vor diesem die Excision. Der Erfolg war gut, nur mußte später auch der nerv. frontalis in der Orbitalhöhle excidirt werden.

Im Jahresbericht 1870 II. Band pag. 360 liefert Podrazki noch einen Nachtrag zu seinem Aufsatze über die Refection des 2. Astes des trigeminus, welcher im vorigen Jahresbericht referirt wurde. Er vergleicht die Methode von Carnochan (Trepanation des antrum Highmori) mit der Methode von Bruns (partielle Refection der Orbitalplatte mit der Stichsäge), welche von Weinlechner und Wagner ausgeführt wurde, und endlich mit der osteoplastischen Refection, welche Billroth und von Nufsbaum zu gleichen Zwecken ausführten. Verfasser erklärt sich dahin, daß wesentlich die letztere Methode, das temporäre Emporschlagen der oberen Hälfte des Oberkiefers und die Wiedereinpflanzung nach vollendeter Refection des Nervenstammes in der fossa pterygopalatina die allergrößten Vorzüge besitzt. Endlich erwähnt noch Podrazki die Methode Wagners mit dem reflectirenden Hohlhebel zur Durchschneidung des nerv. infraorbitalis, welche indessen, wie Podrazki angibt, für die ganze centrale Durchschneidung des Nerven wohl zu unsicher ist. —

Im Centralblatt für Chirurgie, herausgegeben 1878, wird eine Neurectomie des II. Astes des nerv. trig. nach osteoplastischer Refektion des Jochbeins von Dr. Hermann Loffen beschrieben. Eine 55jährige Frau hatte seit 7 Jahren die heftigsten Gesichtschmerzen. Am 8. Juli 1877 wurde die Frau operirt, am 10. Dezember, also 5 Monate nach der Operation, localisirte die Patientin Nadelftiche und thermische Reize an der linken Wange und der linken Seite der Stirne beinahe ebenso rasch wie rechts. Bruns meint, die Wieder-

kehr des Taft- und Temperatur-Gefühles könne nur durch Nebenleitung geschehen.

In Schmidts Jahressbuch 1864 Seite 194 ist von Herrn Dr. Bratfch ein Bericht über 93 Nerven-Refectionen, 5 Carotis-Unterbindungen und 1 osteoplastische Oberkiefer-Refection, welche von Prof. Dr. von Nufsbaum in München zur Heilung des Gesichtschmerzes ausgeführt wurde.

Kommt auch nicht eine vollkommene Befreiung des Schmerzes, so ist es jedenfalls erträglicher als vor der Operation; übrigens ist die Heilung bei weitem öfters als die Besserung. Manchmal gelang es, den Schmerz zu beseitigen durch die Unterbindung der Carotis, namentlich in Fällen, wo der Schmerz spontan ohne centripetale Reizung entstand. Carotis-Ligatur und Refection half bei von Nufsbaum immer. In einem anderen Falle nützte die Unterbindung der carotis auch gar nichts und erst die Refection war schmerzstillend. Das Auftreten der Recidiven ist zweifellos an die Neubildung von Nervenfasern in der Zellgewebs-Narbe gebunden, die Individualität spielt eine grosse Rolle. Die mikroskopische Untersuchung lieferte negative Resultate.

Im Centralblatt 1882 veröffentlicht Professor Braun in Heidelberg 5 Neurectomien des 2. Astes des 5. Nervenpaares nach osteoplastischer Refection des Jochbeins.

Ob nach der Refection des 2. Astes vom trigeminus andauernde Heilung der Neuralgie beobachtet wird, als wenn die Durchschneidung des Nerven in dem canalis infraorbitalis vorgenommen wird, wie dieses Lücke hoffte, kann erst durch eine grössere Zahl von Beobachtungen erwiesen werden. Recidiven kamen bei allen 5 Kranken, beim ersten nach $2\frac{3}{4}$ Jahren, beim 5. nach 4 Monaten, jedoch erreichten die Schmerzen nie mehr den hohen Grad als vor der Operation, wo sie fast unerträglich waren. Ist die Heilung also auch nicht vollständig gewesen in den 5 beschriebenen Fällen, so ist es doch ein grosses Glück für den Kranken, wenn er Monate lang von

einem so herben Uebel ganz befreit ist und dann, wenn es wieder kommt, nur schwach auftritt. —

Im Schmidt's Jahresbuch 1878 Seite 191 ist folgendes zu lesen:

Dr. Karl Fieber in Wien theilt 3 Fälle von Gesichts-Neuralgien mit, welche durch die Oberkiefer-Resection theilweise geheilt, theilweise aber nur gebessert wurden. Diese Fälle bieten nämlich dadurch besonderes Interesse, daß sie lange nach der Operation noch der Beobachtung zugänglich waren, so daß die Resultate vollkommen sicher gestellt sind.

1. Fall war eine Neuralgie des nervus supraorbitalis. Operation: Resection des nervus supraorbitalis und nervus frontalis.

2. Neuralgie des nerv. supraorbitalis dexter. Operation: Resection des nervus supraorbitalis dexter und des nervus frontalis.

3. Neuralgie des nerv. infraorbitalis und inframaxillaris. Operation: Resection des nervus infraorb. und des nerv. inframaxillaris. —

Dr. Léon Tripier führt in einem Falle von Facial-Neuralgie, in dem Berührung und Druck in einer gewissen begrenzten Zone die Anfälle hervorrief, die Resection des nervus infraorbitalis und des nervus dentalis superior anterior und posterior mit Resection eines Stückes vom Oberkiefer aus.

Dr. Hermann Loffen führte eine Resection des 2. Astes des trigeminus nach osteoplastischer Resection des Jochbeins bei einer 55 jährigen alten Frau aus wegen heftiger Gesichtschmerzen, die vom foramen infraorbitale sinistrum aus gegen die Nase, Wange und Mund hin ausstrahlten und später im Gebiete des trigeminus auftraten.

Josef Bell hat wiederholt den nervus trigeminus an dem foramen rotundum, durch das er austritt, durchschnitten, die Erfolge waren aber nur vorübergehende, nie von längerer Dauer. Besser war der Erfolg, wenn noch ein Stück vom

Nerven innerhalb des foramen rotundum zerstört wurde, am besten ist es, die Operation möglichst weit rückwärts am Nerven vorzunehmen.

Dr. Weinlechner theilt einen Fall mit, in welchem auf die Resection des nervus inframaxillaris nach Pallaricini heftige, mehrmals kommende und schliesslich die Unterbindung der carotis nöthig machende Blutung auftrat. Nach der Ligatur der carotis aber trat Unbesinnlichkeit, Gedächtnis-Schwäche, Aphasie und rechtsseitige Lähmung auf, schliesslich aber erfolgte trotzdem die vollkommene Heilung und all die grossen Nachtheile, welche die carotis Unterbindung setzte, verschwanden und Patient war von seinem grossen Uebel, wenn auch auf Umwegen, geheilt. —

Wem gebührt aber die Priorität, den Franzosen oder den Deutschen, betreffs der Erfindung der Operation?

Die Idee der osteoplastischen Oberkiefer-Resection spricht der Franzose Huguier im Jahre 1852 in klarer Weise aus, desgleichen der Franzose Desprez im Jahre 1857.

B. von Langenbeck jedoch hatte das erste Mal die temporäre Oberkiefer-Resection im Jahre 1861 ausgeführt, indem er den processus nasalis maxillae superioris nebst dem os nasi dieser Seite von drei Seiten frei präparirte, umsägte, an einer Perioftbrücke hängen liess und dann umklappte; kurze Zeit darauf aber machte von Langenbeck nach dem Vorschlage Huguier die Operation in der Weise, dass er den Oberkiefer mit sammt den Weichtheilen der Wange nach aussen umschlug, um ein Fibroid in der fossa pterygopalatina zu extirpiren.

Entschieden aber gebührt Herrn Geheimrath von Nussbaum das Verdienst, diese von Langenbeck'sche Oberkiefer-Resection mit einigen Modificationen auch zur Resection des 2. Astes des Trigemini an seinem Austritte aus der Schädelhöhle am foramen rotundum das erste Mal im Jahre 1863

angewendet zu haben und zwar ohne Verletzung des Alveolar-Fortsatzes des Oberkiefers, des harten Gaumens und Gaumensegels mit nachheriger Wiedereinfügung des resezirten Theiles.

Zum Schlusse spreche ich nun Herrn Geheimrath v. N u f s-
baum meinen innigsten Dank aus für die gütige Ueberlassung
des Krankheitsfalles. —
